

Экспресс®

Технология без ограничений в севообороте

Гербицид

Экспресс® - послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах специальных гибридов подсолнечника.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, включая злостные и трудноискоренимые (виды осотов, бодяков, амброзия и др.).
- Гибкость сроков и норм внесения.
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре.
- Безопасность для последующих культур севооборота.
- Подавляющее действие на заразику.
- Максимальная реализация потенциала урожайности подсолнечника.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Действующее вещество: трибенурон-метил (750 г/кг)

Химический класс: сульфонилмочевины

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка: 200 г

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Экспресс® поглощается главным образом через листья и далее легко перемещается в сорняках. Действующее вещество Экспресс® блокирует в чувствительных растениях фермент ацетолактатсинтазу, участвующий в цепи биосинтеза незаменимых аминокислот. Подавление фермента приводит к быстрой остановке роста растений, затем к их гибели.

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка от 2 до 8 настоящих листьев подсолнечника.
- Однолетние двудольные сорняки на ранних стадиях развития (2-6 листьев).
- Амброзия, дурнишник, марь - семядоли - 2 листа.
- Подмаренник цепкий - до 4-х мутовок.
- Многолетние сорняки (виды осотов и бодяков) - розетка 10-15 см.
- Вьюнок полевой - длина побегов 25-30 см.

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Один раз за сезон в норме 25-50 г/га.
- Возможно двукратное применение (суммарно не более 50 г/га за сезон).
- Один раз за сезон в норме 40-50 г/га по переросшим сорнякам.
- Норма внесения ПАВ Тренд® 90 - концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего раствора).

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

| КУЛЬТУРА | ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ | НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, кг/га | СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК) |
|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Подсолнечник, устойчивый к гербициду Экспресс® | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,025-0,05 | Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с ПАВ Тренд® 90, Ж (200 мл/га) | 60(1) |



ЗАЩИТА ДЛЯ ЛУЧШЕГО РОСТА

Экспресс® Голд Экспресс защита без ограничений!

Гербицид

Экспресс® Голд - инновационный послевсходовый гербицид для защиты специальных гибридов подсолнечника от широколистных сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенное действие на проблемные однолетние двудольные сорняки, включая трудноискоренимые (виды осотов, мари, горцев; амброзию, дурнишник, канатник Теофраста и др.).
- Гибкость сроков (2-8 листьев культуры) и норм внесения (40 г/га или дробно 20 + 20 г/га).
- Высокая селективность к специализированным гибридам подсолнечника устойчивым к гербициду Экспресс® Голд.
- Подавляющее действие на заразику.
- Безопасность для любых последующих культур севооборота.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Действующее вещество: трибенурон-метил (562,5 г/кг) + тифенсульфурон-метил (187,5 г/кг)

Химический класс: сульфонилмочевины

Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Упаковка: 200 г

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Экспресс® Голд поглощается главным образом через листья, быстро перемещается в сорняках, в результате чего блокируется фермент АЛС ацетолактатсинтаза) участвующий в синтезе незаменимых аминокислот. Подавление фермента приводит к быстрой остановке роста чувствительных видов сорняков, затем к их гибели.

СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка от 2 до 8 листьев подсолнечника.
- Однолетние двудольные сорняки на ранних стадиях развития (2-6 листьев).
- Амброзия, дурнишник, марь - семядоли - 2 листа.
- Подмаренник цепкий - до 4-х мутовок.
- Многолетние (бодяк и виды осотов) - розетка 10-15 см.
- Вьюнок полевой - длина побегов 25-30 см.

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Один раз за сезон в норме не более 40 г/га.
- Двукратное применение 20 + 20 г/га.
- Один раз за сезон в норме 40 г/га по переросшим сорнякам.
- Норма внесения ПАВ Тренд® 90 - концентрация 0,1% (100 мл на 100 л рабочего раствора).

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

| КУЛЬТУРА | ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ | НОРМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА, кг/га | СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТОК) |
|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Подсолнечник, устойчивый к гербициду Экспресс® Голд | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,04 | Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Тренд® 90, Ж (200 мл/га) | -(1) |
| | | 0,02 + 0,02 | Дробное опрыскивание посевов 1-е в фазу 2-4 листьев, 2-е в фазу 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с ПАВ Тренд® 90, Ж (200 мл/га) | -(2) |